

Factsheet

Topische Steroide

Erstellt von: Hans Fischer, Leander Muheim

Zuletzt revidiert: 06/2021 / **Letzte Änderung:** 06/2021

PDF erstellt am: 17.05.2024

Link: <https://www.medix.ch/wissen/guidelines/topische-steroide/>

Liste topischer Steroide und rückfettender Präparate

Topische Steroidpräparate (D07)	Wirkstoffe	Spezifische Indikation	Spezielle Lokalisation	Kommentar
Monopräparate				
Alfacorton Creme 2,5 %	Hydrocortison (Gruppe I; schwach)		Endogenes Ekzem bei Kindern als Alternative zu Premandol	Sonst schwach wirksam
Ultracortenol Augensalbe	Prednisolon (Gruppe I; schwach)		Haut der Augenlider bei mässig ausgeprägtem Lidsekzem. (Bei Applikation im Konjunktivalsack systemisch Wirkung beachten!)	Schwach wirksam. Bei dünner Haut periorbital und mit Depotwirkung der Salbengrundlage am Augenlid aber gut wirksam
Locoid Crelo Emulsion 0,1 %	Hydrocortison butyrat (Gruppe II; mittelstark)		Kann bei Ekzemen grossflächig aufgetragen werden. Auch gut geeignet bei Ekzemen auf der Kopfhaut	Obwohl zugelassen, bei Kopfhautpsoriasis zu schwach wirksam
Emovate Salbe	Clobetasol butyrat (Gruppe II; mittelstark)			
Ovixan Creme 1 mg/g	Mometason furoat (Gruppe III; stark)		Bis zu 4 Wochen einmal täglich abends. Max. 7 Tage im Gesicht, Vorsicht intertriginös: UAW!	Gut geeignet für Behandlung von Hand- und Unterschenkel-ekzemen über mehrere Wochen
Elocom Lösung 1 mg/g	Mometason furoat (Gruppe III; stark)		Wie Ovixan Creme	1 x täglich
Elocom Salbe 1 mg/g	Mometason furoat (Gruppe III; stark)		Wie Ovixan Creme, allerdings stark fettend. Ist der Galenik nach eine Fettsalbe	1 x täglich
Advantan Creme 0,1 %	Methylprednisolon aceponat (Gruppe III; stark)	Kinder Neurodermitis Kontaktekzeme	Geeignet auch für Gesichtsekzem	Auch in SS, bei Babys ab 6 Mt., bis 50 % der KOF, wird kaum resorbiert: „smart“, nur kurze, mittelstarke Wirkung in der Haut, dann Zerfall in unwirksame Komponenten
Prednitop Creme 0,25 %	Prednicarbat (Gruppe III; stark)	Kinder Neurodermitis Kontaktekzeme	Geeignet auch für Gesichtsekzem	Wie Advantan, allerdings nicht bei Säuglingen zugelassen
Prednitop Salbe 0.25 %	Prednicarbat (Gruppe III; stark)	Wie Creme, auf eher trockener Haut		
Dermovate Creme	Clobetasol (Gruppe IV; sehr stark)			Stark als Creme und Salbe nur zurückhaltend! Kleine Fläche, nur 10 Tage, nicht intertriginös, nicht in Achsel/Leiste. Kleine Flächen z. B. bei Psoriasis sind ok
Topsym Polyvalent Salbe	Fluocinonid (Gruppe III; stark)			

Kombipräparate				
Travocort Creme	Isoconazol, Diflucortolon 21 valerat		Genital, Fusssohlenränder, Abwechslung mit Excipial Mandelöl	Sehr starkes Cortison. Vorzugsweise im Genitalbereich; genital ist stärkste Wirkung benötigt, weil i. d. R. nur kurze Einwirkungszeit möglich
Tobradex Augensalbe	Dexamethason, Tobramycin (Gruppe II; mittelstark)		Augen: Wenn stärkere Behandlung gewünscht	
Fucicort Creme 2 %	Betamethason, Fusidinsäure (Gruppe III; stark)			Keime gewöhnen sich schnell an Fusidinsäure (nach 5–7 Tagen); dann nur bakteriostatisch. Max. 10 Tage
Diprogenta Salbe	Betamethason, Gentamicin (Gruppe III; stark)	Bakteriell superinfizierte Ekzeme Lippenekzem	Lippen (nur Salbe) da geschmacksneutral, im Wechsel mit Excipial Mandelöl Salbe; Salbe hat auf dünner Haut und Übergangschleimhaut längere Verweildauer und Depotwirkung. Reizt auch auf erosiver Haut nicht	Max. 10–15 Tage Auch Ersatz für Fucicort (Creme)
Imacort Creme	Clotrimazol, Hexamidin, Prednisolon acetat (Gruppe I; schwach)			Bei Balanitis kontraindiziert
Triderm Creme	Betamethason, Clotrimazol, Gentamicin (Gruppe III; stark)			Für mikrobiell überlagerte Ekzeme wesentlich besser als Mycolog geeignet
Mycolog N Creme	Fluocinonid, Gramicidin, Neomycin, Nystatin (Gruppe III; stark)			Neomycin hat hohes Allergisierungspotential Nystatin sehr schmales Wirkungsspektrum
Mycolog N Salbe	Fluocinonid, Gramicidin, Neomycin, Nystatin (Gruppe III; stark)			
Diprosalic Lösung	Betamethason, Salicylsäure (Gruppe III; stark)			
Diprosalic Salbe	Betamethason, Salicylsäure (Gruppe III; stark)			
Daivobet			Psoriasis, Gel auch Kopfhaut	
Enstilar		Schaum; generiert lokal höchste Konzentration, mit verlängerter Wirkung	Psoriasis, auch Kopfhaut	Besser wirksam als Xamiol oder Daivobet bei gleicher Konzentration

Rückfettende Präparate (D02)	Wirkstoffe	Spezifische Indikation	Spezielle Lokalisation	Kommentar
Antidry Lotion	Milchsäure, Mandelöl			
Dexeryl Creme	Glycerol, Vaseline, Paraffin			
Excipial Mandelölsalbe Salbe	Mandelöl, Zinkoxid			
Excipial U Hydrolotio	Harnstoff			
Excipial U Lipolotio	Harnstoff			
Linola Fett Emulsion	Fettsäuren			
Linola Emulsion	Linolsäuren			
OXYPLASTIN Wundpaste	Zinkoxid			
Sonstige				
Excipial Kerasal Salbe	Salicylsäure, Harnstoff			

06/2021

Autoren:

Dr. med. Hans Fischer

Dr. med. Leander Muheim